

第 1 阶段调查问卷

一、甄别问卷

- 1.城市
- 2.医院级别
- 3.医生科室
- 4.具体外科科室
- 5.具体内科科室
- 6.医生职称

二、主问卷

1. 您最熟悉以下哪些结直肠癌诊疗规范？
 - A.中国结直肠癌诊疗规范(2015)
 - B.NCCN 临床实践指南：结肠癌(2017.V1)
 - C.中国临床肿瘤学会(CSCO)结直肠癌诊疗指南(2017.V1)
 - D.ESMO 欧洲临床肿瘤协会结直肠癌诊疗指南
2. 您临床实践遵循以下哪些结直肠癌诊疗规范，进行结直肠癌疾病的诊断和治疗？
 - A.中国结直肠癌诊疗规范(2015)
 - B.NCCN 临床实践指南：结肠癌(2017.V1)
 - C.中国临床肿瘤学会(CSCO)结直肠癌诊疗指南(2017.V1)
 - D.ESMO 欧洲临床肿瘤协会结直肠癌诊疗指南
3. 直肠癌的局部分期检查推荐以下哪个
 - A.盆腔 MRI
 - B.盆腔 CT
 - C.直肠腔内超声
 - D.PET-CT
 - E.不知道
4. 结直肠癌的分期诊断中，哪一个检查并非必要？
 - A.胸部 CT
 - B.盆腔核磁
 - C. PET-CT
 - D.肠镜检查
 - E.不知道
5. 结直肠癌的病理检查淋巴结应达到多少枚
 - A.11
 - B.12
 - C.13
 - D.14
 - E.不知道
6. 结直肠癌临床分期以哪个字母表示？
 - A.cTNM
 - B.bTNM
 - C.dTNM
 - D.pTNM
 - E.不知道

7. T₃ 以上的中低位直肠癌，建议

- A.术前化疗
- B.术后放疗
- C.术前放化疗
- D.术后放化疗
- E.不知道

8. 您所有的结直肠癌患者中，有多少患者需要进行化疗方案？

- A. 0~20%
- B. 20%~40%
- C. 40%~60%
- D. 60%~80%
- E. 80%~100%

9. 这些需要进行化疗的患者中，实际进行了化疗的比例是多少？

- F. 0~20%
- G. 20%~40%
- H. 40%~60%
- I. 60%~80%
- J. 80%~100%

10. 早中期结直肠癌术后辅助化疗中，您更多选用以下哪种方案是？

- A. FOLFOX
- B.XELOX
- C.FOLFIRI
- D.XELIRI
- E.5-FU 单药治疗
- F.卡培他滨单药治疗
- G.转肿瘤科
- H.早期不用化疗
- I.看是否有高危因素和 MMR 的表达情况而定
- J.高危 II 期，可选择单药。
- K.二期肿瘤不推荐常规化疗，根据术后病理高危因素判断是否化疗
- L.不化疗

11. 晚期结直肠癌的一线化疗方案。您更多选择哪种方案？

- A. FOLFOX
- B.XELOX
- C.FOLFIRI
- D.XELIRI
- E.肿瘤科
- F.根据年龄，体质状况
- G.都用
- H.SOX

12. 组织标本 MMR 或者 MSI (微卫星不稳定性) 的检测，如为 dMMR (错配修复缺陷) 或 MSI-H (微卫星不稳定)，以下表达正确的是

- A.推荐氟尿嘧啶类药物的单药辅助化疗
- B.不推荐氟尿嘧啶类药物的单药辅助化疗
- C.推荐氟尿嘧啶类药物的联合用药辅助化疗
- D.不推荐氟尿嘧啶类药物的联合用药辅助化疗
- E.不知道

13. 关于伊立替康表达错误的是
- A.腹泻是常见副作用
 - B.可以用于结直肠癌辅助化疗
 - C.和奥沙利铂互为肠癌一二线药物
 - D.可用于结直肠癌肝转移的术前新辅助化疗
 - E.不知道
14. 结直肠癌最常用的靶向药物是
- A.注射用曲妥珠单抗
 - B.吉非替尼片
 - C.贝伐珠单抗注射液
 - D.盐酸厄洛替尼片
 - E.西妥昔单抗注射液
 - F.不知道
 - G.左半选西妥昔，右半选贝伐
 - H.分左、右半结肠，左半常用西妥昔，右半常用贝伐
 - I.贝伐和西妥昔
 - J.贝伐，爱必妥
 - K.KRS/NRS/BRAF.突变首选贝伐，野生型选西妥，若 Her-2+选用赫赛汀
15. 不是结直肠癌常规复查内容的是
- A.胸部 CT
 - B.腹部超声
 - C.CEA
 - D.PET-CT
 - E.不知道
16. 中低位直肠癌手术应遵循什么原则
- A.CME 原则
 - B.TME 原则
 - C.TaTME 原则
 - D.TEM 原则
 - E.不知道
17. 您认为 2015 年版的结直肠癌诊疗规范有哪些需要改进的地方？
- 开放题
18. 您认为更新版的结直肠癌诊疗规范用什么宣传方式更好？
- 开放题

第 2 阶段调查问卷

一、甄别问卷

- 1.城市
- 2.医院级别
- 3.医生科室
- 4.具体外科科室
- 5.具体内科科室
- 6.医生职称

二、主问卷

1. 对于潜在可切除的转移性结直肠癌患者，是否进行转化治疗？如果是，您通常采用以下哪些治疗方案？

- A.FOLFOX 或 FOLFIRI 或 CapeOX
- B.FOLFOXIRI
- C.FOLFOX/ FOLFIRI+西妥昔单抗
- D.FOLFOX/ FOLFIRI/ CapeOX+贝伐单抗
- E.卡培他滨+贝伐单抗
- F.不进行转化治疗/不能进行转化治疗

2. 如果进行转化治疗靶向治疗药物贝伐珠单抗，您一般用于什么类型的患者？

- A.左半(K)RAS 野生， BRAF 野生患者
- B.左半(K)RAS 野生， BRAF 突变患者
- C.右半(K)RAS 野生
- D. (K)RAS 突变患者
- E. (K)RAS 状态未知的患者(未送检患者)

3. 如果进行转化治疗靶向治疗药物西妥昔单抗，您一般用于什么类型的患者？

- A.左半(K)RAS 野生， BRAF 野生患者
- B.左半(K)RAS 野生， BRAF 突变患者
- C.右半(K)RAS 野生
- D. (K)RAS 突变患者
- E. (K)RAS 状态未知的患者(未送检患者)

4. 对于转移性结直肠癌患者，手术治疗进展后，是否在科室进行姑息治疗？如果是，您通常采用以下哪些治疗方案？

- A.FOLFOX 或 FOLFIRI 或 CapeOX
- B.FOLFOXIRI
- C.FOLFOX/ FOLFIRI+西妥昔单抗
- D.FOLFOX/ FOLFIRI/ CapeOX+贝伐单抗
- E.卡培他滨+贝伐单抗
- F.不进行姑息治疗/不能进行姑息治疗

5. 如果进行姑息治疗靶向治疗药物贝伐珠单抗，您一般用于什么类型的患者？

- A.左半(K)RAS 野生， BRAF 野生患者
- B.左半(K)RAS 野生， BRAF 突变患者
- C.右半(K)RAS 野生
- D. (K)RAS 突变患者
- E. (K)RAS 状态未知的患者(未送检患者)

6. 如果进行姑息治疗靶向治疗药物西妥昔单抗，您一般用于什么类型的患者？

- A.左半(K)RAS 野生， BRAF 野生患者
- B.左半(K)RAS 野生， BRAF 突变患者
- C.右半(K)RAS 野生
- D. (K)RAS 突变患者
- E. (K)RAS 状态未知的患者(未送检患者)

7. 您在为 mCRC 患者制定最佳药物治疗方案时的依据有哪些？您最关注下列哪些因素？

- A.指南推荐
- B.临床证据
- C.个人经验
- D.患者 ECOG 评分
- E.治疗费用
- F.方便性
- G.生物标记物
- H.患者及家属意愿
- I.药物副反应

8. 学术活动议程中，有一个环节是“临床实践 Workshop”，我们将以讨论的形式开展，以下哪些主题您比较感兴趣？

(1) CRC 外科讨论话题

- A.结直肠癌肝转移转化治疗选择何方案最佳？
- B.转化治疗后进行手术，术后是否需要继续全身治疗？
- C.初始可切除的 mCRC 患者，新辅助治疗的价值和适用人群
- D.III期辅助治疗的选择，XELOX 和 FOLFOX 两个方案如何选择？
- E.直肠癌如果新辅助治疗后达到临床完全缓解（cCR），在日常临床实践中，你的中心会推荐患者：①手术，②观察等待
- F.其他（自填）

(2) CRC 内科讨论话题

- A.mCRC 患者靶向药物的选择以及治疗顺序
- B.BRAF 突变型患者的治疗探索
- C.直肠癌患者术前放化疗的适应人群和治疗策略
- D.一期和二期的结肠癌患者是否需要化疗？
- E.其他（自填）